

強力

スペースエージ

植物が満足する総合栄養材

3-4-3

微量
要素

ほう酸・鉄・亜鉛
銅・モリブデン

クロレラ
抽出物

核酸関連物質
糖タンパク・多糖体
アミノ酸・ビタミン

酵母
エキス

アミノ酸・ビタミン


トレハ
ロース

糖質

もろみ
エキス

有機酸・アミノ酸

特長 強カスペースエージの主成分が植物を刺激し、植物のバランスを整えます。



その他
特長

- 食味・糖度向上
- 果実肥大
- 成り疲れ防止
- たな持ち向上

定植後の活着促進、樹勢保持、糖度不足の場合は10a当り500g(400ml)を灌水処理をしてください。

葉面散布の場合は1,000倍(水量100Lに80ml)でご使用ください。

農薬との混合使用が効果的です。

使用方法 (使用量《希釈倍数・量・処理間隔・回数》は樹勢をみて加減して下さい)

	施用方法(灌水10a当たり)	散布回数目安					
		果菜類	葉菜類	根菜類	花卉類	果樹類	茶木
育苗期	1,500~2,000倍: 葉面散布・灌水	10日毎	10日毎		10日毎		
定植期	1,000倍: 定植前・どぶ漬け 定植後・灌水	各1回	各1回		各1回		
生育期	1,000倍: 葉面散布	10日毎	初期10日毎	2回	10日毎		
	500g: 灌水		初期1~2回		1~2回		1回
開花期	1,000倍: 葉面散布					3回	
肥大期・結球期	1,000倍: 葉面散布						
	500g: 灌水		初期1回				
収穫期	500g: 灌水						
収穫後	1,000倍: 葉面散布					2~3回	2回
萌芽期	500g: 灌水(2,000倍)					2回	2回
生育不良・なり疲れ時 曇天時・大雨後	500~1,000倍: 葉面散布 500g: 灌水	2~3回を2~3日毎に葉面散布 2~3回を5日毎に灌水					

使用上の注意

- 直射日光を避け冷暗所に保存して下さい。又厳寒期は凍らない場所で保存して下さい。
- 本剤の希釈液は保存がきかないので、その都度、必要量だけを希釈して、使用して下さい。
- 農薬(殺菌剤、殺虫剤)との混合使用をする場合は、あらかじめ農薬を所定量の濃度に希釈した後で、必要量の強カスペースエージを加えてください。但し、強アルカリ性の農薬は避けてください。

取り扱い販売店

取り扱い販売店